




Bureau 4








QK315  
H328  
atlas  
v. 2





*Oxytropis campestris* (L.) de Cand. — Feld-Spitzkiel.  
Alpenkette, Wiesen, 1300–2200 M., auf Urgestein. Juni–August.









*Oxytropis Lapponica* (Wahlenb.) Gaud. — Lappländ. Spitzkiel.  
 Schweiz, Südtirol, Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 2000–2500 M. auf Urgestein.  
 Juli–August.









*Oxytropis Jacquinii* Bunge = *montana* Jacq. — Jacquins Spitzkiel.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M. bes. auf Kalk. Juli, August.









*Oxytropis neglecta* Gay (1850) = *cyanea* Gaud., Koch et aut.  
nec M. Bieb. = *Gaudini* Bunge 1851. — Vernachlässigter Spitzkiel.

Schweiz, Tirol bis Kärnten, trockene Stellen, 1900–2500 M., Juli, August.









*Astragalus australis* (L.) Peterm. = *Phaca australis* L. Koch. —  
Südlicher Tragant.

Schweiz bis Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 1700–2300 M., Juli, August.









*Astragalus alpinus* L. = *Phaca astragalina* De Cand. –  
Alpen-Tragant.

Schweiz bis Steiermark, besonders auf Urgestein, 1600–2200 M. Juli–August.









*Hippocrepis comosa* L. — Schopfiger Hufeisenklee.  
 Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., besonders auf Kalk. Juni–August.









*Hedysarum obscurum* L. — Dunkler Süßklee.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M. bes. auf Kalk. Juli, August.









*Orobus Styriacus* Gremlí (1882). — Steierische Walderbse.  
Oestliche Alpenkette, Steiermark, Gebüsch, Mai, Juni.









*Dryas octopetala* L. — Achtblättrige Dryade, Silberwurz.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–2200 M. auf Kalk, Juni–August,









*Geum montanum* L. — Berg-Benediktenkraut.

Alpenkette, auf Alpenwiesen. 1200—2300 M. Juni, Juli.









*Geum reptans* L. — Kriechendes Benediktenkraut.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. bes. auf Urgestein. Juni, Juli.









*Comarum palustre* L. — Sumpf-Blutauge.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1600 M. Juni—August









*Potentilla nitida* L. — Schönes Fingerkraut.

Südliche Alpenkette, 2000—3000 M. Juli, August.









*Potentilla Clusiana* Jacq. — Clusius' Fingerkraut.  
Tirol, Salzburg, Ober-Baiern, Steiermark und Nieder-Österreich, trockene Stellen.  
1600–2000 M., auf Kalk, Juli, August.









*Potentilla caulescens* L. — Vielstängeliges Fingerkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M. auf Kalk, Juni, Juli.









*Potentilla nivea* L. — Schneeweisses Fingerkraut.

Schweiz, Tirol und Salzburg, trockene Stellen, 1900—2200 M., auf Schiefergestein,  
Juli, August.









*Potentilla aurea* L. — Goldgelbes Fingerkraut  
Alpenkette, Wiesen, 1300–2400 M., besonders auf Kalk. Mai–Juli









*Potentilla villosa* (Crntz. 1769) = *maculata* Pourr. 1788 =  
*salisburgensis* Hänke 1788 = *rubens* Vill. 1789 = *crocea* Hall.  
 Schlecht. h. 1807 = *alpestris* Hall. Fil. 1823. - Zottiges Fingerkraut.  
 Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., auf Urgest., selten auf Kalk, Juli, August.









*Potentilla grandiflora* L. — Grossblüthiges Fingerkraut.  
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, über 1600 Meter. Juli–August









*Potentilla minima* Hall. fil. (1794) = *Brauneana* Hoppe 1800.  
— Kleinstes Fingerkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1300–2400 M. bes. auf Kalk, Juni, Juli.









*Potentilla frigida* Vill. — Kälteliebendes Fingerkraut.  
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2200–2500 M., auf Urgestein, Juli, August.









Sibbaldia procumbens L. — Niederliegende Sibbaldie, Gelbling.  
 Alpenkette, Wiesen, 1600—2200 M., besonders auf Urgestein, Juni, Juli.









*Rosa alpina* L. — Alpine (Alpen-) Rose.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1800' M. Mai, Juni.









*Alchemilla pubescens* M. Bieb. — Flaumhaariger Frauenmantel.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2200 M., auf Kalk, Juni—Juli.









*Alchemilla fissa* Schum. = *Pyrenaica* Garke et aut., nec Duf.

— Spaltblättriger Frauenmantel.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1900—2300 M., auf Urgestein, Juni, Juli.









*Alchemilla alpina* L. — Alpen-Frauenmantel.

Alpenkette, auf Triften, bis 1800 M. Juni—August.









*Alchemilla pentaphyllea* L. — Fünfblättriger Frauenmantel.  
Schweiz u. Tirol, Gletscher, 1860—2500 M. Juli, August.









*Aronia rotundifolia* Pers. — Rundblättrige Felsenbirne.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M. Mai, Juni,









*Sorbus Chamaemespilus* (L.) Crntz. — Zwerg-Vogelbeere.  
Alpenkette, Gebüsch, 1500—1800 M. auf Kalk. Juni—Juli.










*Epilobium rosmarinifolium* Haenke — 'Dodonaci Koch nec Vill. ...  
Rosmarinblättriges Weidenröschen.

Alpenkette, auf Kalkgerölle, bis 1600 M. Juli—August.









*Epilobium alsinefolium* Vill. (1779) = *origanifolium* Lam. 1786.

— Mierenblättriges Weidenröschen.

Alpenkette. feuchte Stellen, 1300–1900 M., Juli, August.










*Epilobium anagallidifolium* Lam. = *alpinum* Koch et aut. nec L.

— Gauchheilblättriges Weidenröschen.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1300–2100 M., Juli, August.









**Herniaria alpina L. — Alpen-Bruchkraut.**

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1600–2500 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Rhodiola rosea* L. — Gemeine Rosenwurz.  
 Alpenkette, trockene Stellen, 1300–2200 M., auf Urgestein, Juni, Juli.









*Sedum Anacampseros* L. — Rundblättriges Fettblatt.  
Schweiz und Südtirol, trockene Stellen, 1500—1900 M., Juli, August.









*Sedum atratum* L. = *rubens* Wulf. — Schwärzliches Fettblatt.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2000 M., Juli, August.









*Sedum annuum* L. — Einjähriges Fettblatt.  
Alpenkette, trockene Stellen. bis 2000 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.









*Sedum alpestre* Vill. (1789) = *repens* Schleich. 1805 et aut. nec  
L. = *rubens* Hänke 1788 nec L. — Voralpen-Fettblatt.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600–2300 M., Juli, August.









*Sempervivum Wulfeni* Hoppe. — Wulfen's Hauswurz.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2000–2600 M., auf Urgestein, Juni–August.









*Sempervivum arachnoideum* L. — Spinnwebige Hauswurz.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1300—2000 M. Juli, August.









*Sempervivum montanum* L. — Berg-Hauswurz.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2100 M. Juli, August









*Sempervivum Braunii* Funk. — Braun's Hauswurz.  
Tirol und Kärnten, trockene Stellen, 1800—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Sempervivum Funkii*, Braune. — Funk's Hauswurz.

Ostalpen, auf Gerölle 1700—2100 M. Juli—August










*Sempervivum hiemale* L. --- Kurzhaarige Hauswurz.  
Tirol bis Oesterreich, trockene Stellen, um 1500 M., Juli–September.









*Ribes alpinum* L. — Alpen-Johannisbeerstrauch.

Alpenkette, Gebüsch, 1300—1800 M., auf Urgestein, Juni, Juli.









*Saxifraga hieraciifolia* Waldst. & Kit. — Habichtskrautblättriger Steinbrech.

Ober-Steiermark, feuchte Stellen, bei 1600 M., Juni, Juli.









*Saxifraga arachnoidea* Sternb. --- Spinnenwebiger Steinbrech.  
Südtirol, an feuchten Stellen, 300—2000 M. auf Dolomit. Juli, August.









*Saxifraga cernua* L. — Nickender Steinbrech.  
Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1300–1800 M., Juli, August.









*Saxifraga rotundifolia* L. — Rundblättriger Steinbrech.

Alpenkette, feuchte Stellen, 600—1600 M., bes. auf Kalk, Juni—August.









*Saxifraga controversa* Sternb. = *adscendens* Koch et aut. nec  
L. — Streitiger Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M., Juni, Juli.









*Saxifraga stellaris* L. — Sternblüthiger Steinbrech.

Alpenkette, bes. feuchte Stellen, 1400—2000 M. Juli, August.









*Saxifraga Engleri* D. T. = *Clusii* Koch et aut. geom. nec  
Gouan! *stellaris* L. var. *robusta* Engl. — Engler's Steinbrech.  
Schweiz, Tirol und Salzburg, feuchte Stellen, 1300—1900 M., Juni—August.









*Saxifraga cuneifolia* L. — Keilblättriger Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M., Juni, Juli.









*Saxifraga muscoides* Wulf. (1779) nec. All. (1785). — Moosartiger Steinbrech.

Alpenkette, bes. im nördlichen Zuge, trockene Stellen, 1200—2500 M. bes. auf Kalk. Juli, August.









*Saxifraga exarata* Vill. = *exarata* var.  $\alpha$  *compacta* Koch. —  
Gefurchter Steinbrech.

Schweiz, Tirol, Kärnten bis Krain, trockene Stellen, 1800–2700 M., Juni, Juli.









*Saxifraga Seguieri* Spreng. — Seguer's Steinbrech.  
Schweiz und Tirol, Gletscher, 2700–3200 M., Juli, August.









*Saxifraga androsacea* L. — Mannsschildartiger Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1800–3200 M., Juni, Juli.









*Saxifraga aphylla* Sternb. (1810) = *stenopetala* Gaud. 1818. —

Blattloser Steinbrech.

Alpenkette, trockene Stellen, 2200—3000 M., Juni, Juli.









*Saxifraga sedoides* L. — Fettblattartiger Steinbrech.  
Alpenkette, trockene und feuchte Stellen, 1900–2500 M., auf Kalk, Juli, August.









*Saxifraga aizoides* L. — Immergrüner Steinbrech.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M. Juni—August.









*Saxifraga tenella* Wulf. — Zarter Steinbrech.  
Steiermark und Julische Alpen, trockene Stellen, 1000—1800 M., Juni, Juli.









fl ♀



fl ♂



*Saxifraga aspera* L. — Rauher Steinbrech.

Alpenkette, 1300—2000 M. Juli, August.









*Saxifraga bryoides* L. — Bryumartiger Steinbrech.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1900–2500 M. auf Urgestein, Juli, August.









*Saxifraga crustata* Vest. — Krustiger Steinbrech.

Tirol bis Krain. 900—2200 M auf Kalk. Juli, August.









*Saxifraga mutata* L. — Veränderlicher Steinbrech.

Alpenkette, auf Kalkboden, 800—2000 M. Juli—August.









*Saxifraga brevifolia* Sternb. = *Aizoon* Jacq. — Kurzblättriger Steinbrech.

Alpenkette, auf Kalkboden. 1200—2000 M. Juni—August.









*Saxifraga caesia* L. — Meergrauer Steinbrech.

Schweiz bis Oesterr. u. Steierm., trockene Stellen, 1300–2700 M. auf Kalk und Dolomit,  
Juni, Juli.









*Saxifraga squarrosa* L. — Sporriger Steinbrech.

Südl. Alpenkette, Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1500–2300 M., auf Kalk und Dolom.  
Juli, August.









*Saxifraga Burseriana* L. — Burser's Steinbrech.

Alpenkette, auf Kalk und Dolomit, 1900—2400 M. Juni, Juli.









*Saxifraga Vandellii* Sternb. — Vandelli's Steinbrech.  
Schweiz, Tirol und Steiermark, Mai, Juni.










*Saxifraga oppositifolia* L. — Gegenblättriger Steinbrech.

Nördliche Alpenkette, trockene Stellen, 1900–2500 M., bes. auf Kalk. Juni–August.









*Saxifraga biflora* All. — Zweiblüthiger Steinbrech.  
Alpenkette, trockene Stellen, 2300–3300 M., Juni, Juli.









*Zahlbrucknera paradoxa* (Sternb.) Reichenb. — Wundersame Zahlbrucknere.

Kärnten u. Steiermark, selt. 1050—1200 M. Juni, Juli.









*Hacquetia Epipactis* (L.) de Cand. — Gelbgrüne Hacquetie, Schaftdolde.

Kärnten bis Krain, Gebüsch, bis 1500 M., April, Mai.









***Astrantia minor* L. — Kleiner Thalstern.**

Schweiz und Tirol, Wiesen, 1800—2300 M. auf Urgestein. Juli, August.









*Eryngium alpinum* L. — Alpen-Mannstreue.

Schweiz, Kärnten und Krain, auf Triften, 1500—1900 M. Juli—August.









*Bupleurum petraeum* L. = *graminifolium* Vahl. — Felsen-  
Hasenohr.

Südtirol bis Krain, trockene Stellen, 1600—2300 M., Juli, August.









*Bupleurum ranunculoides* L. — Hahnenfussartiges Hasenohr.  
Schweiz, Tirol und Krain, trockene Stellen, 1500–2200 M., Juli, August,









*Athamanta Cretensis* L. — Kretische Augenwurz.  
Alpenkette, 1300–2300 M., auf Kalk, Juni–August.









*Meum athamanticum* Jacq. — Augenwurzartige Bärwurz.

Alpenkette, besonders östl. Alpen, Wiesen, 1000–2100 M. auf Kalk, Juli-August.









*Meum mutellina* (L.) Gärtn. — Rauten-Bärwurz.

Alpenkette, Wiesen, 1300—2200 M. Juli, August.









*Pachypleurum simplex* (L.) Reichb. = *Gaya* Gaud. 1828 nec  
Kunth. — Einfache Dickrippe.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.









*Laserpitium hirsutum* Lam. — Behaartes Laserkraut.

Südl. Schweiz bis Krain, Gebüsch, trock. Stellen, 1300–2100 M., bes. a. Urgestein, Juli–August.









*Lonicera coerulea* L. — Blaue Lonizere, Heckenkirsche.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., bes. auf Kalk, Mai, Juni.









*Lonicera alpigena* L. — Alpen-Lonizere, Heckenkirsche.  
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., bes. auf Kalk, Mai, Juni.










*Linnaea borealis* L. — Nordische Linnäe, Erdkrönchen.

Schweiz bis Kärnten, Gebüsch, bis 1800 M. Juli, August.









**Galium Helveticum Weig. = rupiculum Bertol. — Schweizerisches Labkraut.**

Nördliche Alpenkette, Schweiz bis Oestrerr., Gebüsch, trockene Stellen, 1900–2500 M. auf Kalk, Juli, August.









*Galium Austriacum* Jacq. = *silvestre* Poll. 1776 var.  $\alpha$  *glabrum*  
 Koch = *commutatum* Jord. 1846 — Oesterreichisches Labkraut.  
 Südtirol bis Oesterreich und Steiermark, trockene Stellen, bis 1600 M., Juni–September.









*Valeriana supina* L. — Niedriger Baldrian.

Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1900–2600 M., bes. a. Kalk, Juli–August.









*Valeriana saliunca* All. — Weidenblättriger Baldrian.

Westl. Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1900—2800 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Valeriana Celtica* L. — Celtischer Baldrian.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900–2500 M., auf Urgestein; nördl. Alpenkette, östl. der Salza, 1600–2000 M., Juni–August.









*Valeriana saxatilis* L. — Felsen-Baldrian.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2100 M. auf Kalk. Juni, Juli.









*Valeriana elongata* L. — Verlängerter Baldrian.

Tirol bis Oesterreich und Krain, trockene Stellen, 1600–2000 M., auf Kalk, Juli, August.









*Valeriana montana* L. — Berg-Baldrian.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—1800 M., Juni—August.









*Knautia longifolia* (Waldst. & Kit.) Koch — Langblättrige  
Knautie, Witwenblume.

Tirol bis Steiermark und Oesterreich, Wiesen, 1300—1600 M., Juli, August.









*Scabiosa lucida* Vill. — Glänzendes Krätzenkraut.  
 Alpenkette, Wiesen, 1500—2100 M., bes. auf Kalk, Juni — September.









*Adenostyles alpina* (L.) Bl. & Fing. — Alpen-Drüsengriffel.

Alpenkette, auf Kalkboden, 1000—1600 M. Juli, August.









*Homogyne discolor* (Jacq.) Cass. — Zweifarbiger Alplattich.  
Tirol bis Oesterreich und Kärnten, Wiesen, 1600–2000 M., auf Kalk, Juni, Juli.









*Homogyne alpina* (L.) Cass. — Gemeiner Alplattich.

Alpenkette, Wälder u. trockene Stellen, 1000—1600 M. Mai—Juli.









*Petasites niveus* (Vill) Baumg. — Schneeweisse Pestwurz.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1500 M. bes. auf Kalk. März—Mai.









*Aster alpinus* L. — Alpen-Sternblume.

Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1560—1900 M. Juli, August.









*Bellidiastrum Michelii* (L.) Cass. — Micheli's Alpenmassliebchen.

Alpenkette, Triften, bis 1900 M. bes. auf Kalk. Mai—Juli.









*Erigeron uniflorus* L. — Einblüthiges Berufkraut.

Alpenkette, auf Urgestein, 1900—2500 M. Juli, August.









*Erigeron Villarsii* Bell. — Villars' Berufkraut.  
Schweiz, Tirol und Kärnten, Wiesen, 1500—1900 M., Juli, August.









*Erigeron alpinus* L. — Alpen-Berufskraut.

Alpenkette, auf Gerölle, 1200—1860 M. Juli, August.









*Solidago alpestris* Waldst. & Kit. = *virgaurea* L. var.  $\delta$  Koch  
Voralpen Goldrute.

Alpenkette, trockene Stellen, Wiesen, 1200—2200 M., Juni, Juli.









*Buphthalmum salicifolium* L. — Weidenblättrige Rindszunge.

Alpenkette, auf Kalkboden, bis 1800 M. Juli—August.









*Gnaphalium Leontopodium* (L.) Scop. — Strahliges  
Ruhrkraut, Edelweiss.

Alpenpflanze, trockene Stellen, 1000—1500 M., hier auf Rade, Juli—September










*Gnaphalium supinum* L. — Niedriges Ruhrkraut

Alpenkette, auf Gerölle, 1580—2300 M. Juni—August.










**Gnaphalium Norvegicum Gunn. — Norwegisches Ruhrkraut.**  
 Alpenkette, trockene Stellen, 1300–1900 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.









*Gnaphalium Hoppeanum* Koch. — Hoppe's Ruhrkraut.  
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.









*Gnaphalium Carpathicum* Wahlenb. — Karpathisches Ruhrkraut.  
Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Artemisia nitida* Bertol. = *lanata* Koch & aut., nec Willd. —  
Glänzender Beifuss.

Südtirol, trockene Stellen, 1600–2000 M., auf Kalk, Juli, August.









*Artemisia glacialis* L. — Gletscher-Beifuss.  
Schweiz, über 1800 M., Juli, August.









*Artemisia mutellina* Vill. — Edelraute

Central-Alpenkette, 2000—2700 M. Juli, August.









*Artemisia spicata*. Wulf. — Aehriger Beifuss.

Südl. Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1800—2500 M. auf Urgestein. Juli, August.









*Artemisia nana* Gaud. — Zwergiger Beifuss.  
Schweiz und Tirol, Juli, August.









*Achillea moschata* L. — Bisam-Schafgarbe.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900–2200 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Achillea atrata* L. — Geschwärzte Schafgarbe.  
Alpenkette, Wiesen, feuchte Stellen, 1600—2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.









*Achillea Clusiana* Tausch. — Clusius-Schafgarbe.

Ostalpen, 1600—2200 M. Juli—August.









*Achillea Clavenae* L. — Chiavenna's Schafgarbe.

Alpenkette, auf Kalkboden, 1700—2200 M. Juni—September.









*Achillea nana* Gaud. — Zwerg-Schafgarbe.

Schweiz und westl. Tirol, trockene Stellen, über 1860 M., auf Urgestein, Juli, August.









*Anthemis Styriaca* Vest — *montana* Koch et aut pp. —  
Steirische Hundskamille.

Steiermark, am hohen Zinken, u. s. w. — August—September.









*Anthemis alpina* L. — Alpenhundskamille.

Tirol bis Steiermark, trockene Stellen, 1800--2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.









*Leucanthemum alpinum* (L.) — Alpen-Wucherblume.

Schweiz bis Oesterreich, Wiesen, 1700—2500 M. Juli, August.

















New York Botanical Garden Library  
S. H328 v.2 gen  
Anton/Atlas der Alpenflora  
3 4043









New York Botanical Garden Library  
QK 315 .H328 v.2  
Hartinger, Anton/Atlas der Alpenflora



3 5185 00108 4043

